

RECURSOS

MARCH OF DIMES

[https://www.marchofdimes.org/complications/neonatal-abstinence-syndrome-\(nas\).aspx](https://www.marchofdimes.org/complications/neonatal-abstinence-syndrome-(nas).aspx)

INSTITUTO NACIONAL SOBRE EL ABUSO DE DROGAS

<https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends>

LOCALIZADOR DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE ABUSO DE SUSTANCIAS

<http://findtreatment.samhsa.gov/>

SPECIALIZED TREATMENT EDUCATION AND PREVENTION SERVICES, INC./S.T.E.P.S.

<https://www.flsteps.org>

Llame a su plan de salud de Medicaid para obtener más información sobre los servicios que ofrecen para ayudarlo a dejar de consumir alcohol u otras drogas.

Si tiene inquietudes sobre el transporte u otros problemas relacionados con obtener atención de su médico, comuníquese con su plan de salud de Medicaid. Si no está inscrito en un plan o no sabe qué plan de salud de Medicaid tiene, comuníquese con nuestra línea de ayuda al:

1-877-254-1055

o visite

www.ahca.myflorida.com/Medicaid



AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD
2727 Mahan Drive
Tallahassee, FL 32308
www.ahca.myflorida.com

V.052020

AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD

La salud de su bebé depende de usted:

Obtenga más información sobre el síndrome de abstinencia neonatal (NAS)





EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL

es un grupo de problemas que ocurren cuando su bebé está expuesto a drogas o alcohol mientras está dentro del vientre suyo. Hable con su médico sobre todos los medicamentos que usted está tomando, incluidas las píldoras recetadas, para proteger a su bebé del NAS.

SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE DROGADICCIÓN :

- Cada 25 minutos nace un bebé que sufre de abstinencia de drogas
- La duración promedio de la estadía en un hospital por NAS es de aproximadamente 17 días
- Las causas más comunes de NAS son:
 - Heroína
 - Codeína
 - Oxycodona
 - Morfina
 - Alcohol

Todos los medicamentos pueden hacerle daño a su bebé, incluso los recetados por su médico. Hable con su médico sobre la mejor manera de mantener a su bebé a salvo del NAS.

ALGUNAS SEÑALES DE ADVERTENCIA QUE DEBE ESTAR ATENTA CON SU BEBÉ

- Sacudidas del cuerpo (temblores)
- Diarrea
- Llanto excesivo
- Fiebre
- Convulsiones
- Problemas para dormir
- Sudor
- Vómito

Esto no incluye todas las señales de advertencia.

Es importante que visite al médico regularmente durante su embarazo para la atención de rutina y el tratamiento necesario. Discuta cualquier inquietud con su médico.



TRATAMIENTO

Los bebés con señales de advertencia pueden necesitar medicamentos y quedarse en el hospital por más tiempo de lo normal.

PREVENCIÓN

Discuta con su médico todos los medicamentos, drogas, alcohol y tabaco que usted consume. Si está embarazada y está usando alguna sustancia que pueda causar NAS, su médico decidirá qué sustancias puede dejar de usar de manera segura. Algunos medicamentos no deben interrumpirse sin supervisión médica, ya que podría causar daños.

SERVICIOS PRENATALES QUE PUEDE RECIBIR A TRAVÉS DE MEDICAID

- Detección de riesgo prenatal
- 10 visitas para atención prenatal de rutina
- Hasta 4 visitas adicionales para un embarazo de alto riesgo
- Suministros, medicamentos, tratamiento
- Coordinación con Healthy Start y otros recursos comunitarios

Comuníquese con su plan de salud de Medicaid para obtener más información sobre los servicios prenatales.